

MAP 5

- ⊕ *Ophiochondrus*
  - 1 *stelliger* (146–1200 m)
- ♦ *Ophiomyxa*
  - 2 *brevirima* (1–1600 m)
  - 3 *duskiensis* (littoral)
  - 4 *vivipara* (74–300 m)
- ● *Ophiactis*
  - 5 *asperula* (1–350 m)
  - 6 *carnea* (0–72 m)
  - 7 *hirta* (90–750 m)
  - 8 *profundi* (50–200 m)
  - 9 *profundi novaezelandiae* (128–260 m)
  - 10 *resiliens* (2–270 m)
  - 11 *seminuta* (80–240 m)
  - 12 *symbiota* (180–600 m)
  - 13 *tricolor*
- ✦ *Ophiozonella*
  - 14 *faulklandica* (242–470 m)
  - 15 *megaloplax* (87 m)



MAP 6

- ■ *Astrochlamys*
  - 1 *bruneus* (120–900 m)
  - 2 *sol* (342 m)
- △ *Astrohamma*
  - 3 *tuberculatum* (150–399 m)
- ▲ *Ophioperla*
  - 4 *koehleri* (70–1080 m)
- ✚ *Ophioplinthus*
  - 5 *grisea* (3500–4636 m)
  - 6 *medusa* (3500–4636 m)
- ○ *Ophiosteira*
  - 7 *antarctica* (25–752 m)
  - 8 *bullivanti* (460–835 m)
  - 9 *debitor* (314 m)
  - 10 *echinulata* (80–800 m)
  - 11 *rotundata* (480 m)
- ● *Theodoria*
  - 12 *frigida* (300–600 m)
  - 13 *partita* (130–500 m)
  - 14 *relegata* (110–430 m)
  - 15 *wallini* (130–640 m)
- ⊕ *Ophiolebella*
  - 16 *biscutifera* (60–463 m)
- • *Other species*
  - 17 *Ophiodictys inanis* (240–569 m)
  - 18 *Ophiosparte gigas* (110–750 m)
  - 19 *Glaciacantha jason* (318–472 m)
  - 20 *Euvondrea floretta* (1335–1375 m)
  - 21 *Ophiomages cristatus* (24–60 m)



Map 5

Ophiomyxa

Arms about 3 in. long, disc about 1 in. across

(after Fell, 1962)



MAP 7

- ■ *Astrotoma*
  - 1 *agassizii* (75–750 m)
- ▲ *Ophionotus*
  - 2 *hexactus* (1–310 m)
  - 3 *victoriae* (5–750 m)
- ✚ *Ophiogona*
  - 4 *döderlini* (475–1080 m)
  - 5 *laevigata* (0–240 m)
  - 6 *tenella*
- ● *Ophiurolepis*
  - 7 *accomodata* (1300 m)
  - 8 *breverima* (200–750 m)
  - 9 *carinata* (130–300 m)
  - 10 *gelida* (40–750 m)
  - 11 *martensi* (17–752 m)
  - 12 *mordax* (240–1600 m)
  - 13 *tuberosa* (200–750 m)
  - 14 *tumescens* (280–2450 m)
  - 15 *turgida* (336–341 m)
- ✱ *Ophioceres*
  - 16 *huttoni* (littoral)
  - 17 *incipiens* (60–600 m)
  - 18 *marginata* (littoral)



MAP 8

- ✪ *Asteronyx*
  - 1 *loveni* (1780–2600 m)
- ▲ *Ophiacantha*
  - 2 *cosmica* (200–4850 m)
  - 3 *rosea* (350–620 m)
- ■ *Ophiernus*
  - 4 *vallincola* (920–3950 m)
- *Ophiactis*
  - ✚ 5 *abyssicola* (800–2000 m)
- ✱ *Ophiocten*
  - 6 *hastatum* (1600–2750 m)
- ● *Ophiura*
  - 7 *figurata* (3550 m)
  - 8 *flagellata* (680–2330 m)
  - 9 *floscellata* (2450 m)
  - 10 *fraterna* (3900 m)
  - 11 *irrorata* (600–4500 m)
  - 12 *jejuna* (900–2000 m)
  - 13 *lenticularis* (3700–4206 m)
  - 14 *ossiculata* (2400 m)
  - 15 *rugosa* (1400 m)
- ⊕ *Ophiomusium*
  - 16 *archaster* (3500 m)
  - 17 *armigerum* (1580–4400 m)
  - 18 *constrictum* (340 m)
  - 19 *lymani* (500–3650 m)
- • Endemic Species
  - 20 *Ophiacantha frigida* (1440–3550 m)
  - 21 *Ophiacantha opulenta* (2725–3550 m)
  - 22 *Ophiolebes scorteus* (570–3200 m)
  - 23 *Ophiolebes vestitus* (300–800 m)
  - 24 *Ophiactis amator* (314–600 m)
  - 25 *Homalophiura scissa* (2500–3400 m)
  - 26 *Ophiocten ludwigi* (2500–4636 m)
  - 27 *Ophiocten pallidium* (3600–5200 m)
  - 28 *Ophiura loveni* (2400–5200 m)
  - 29 *Ophiozonella stellata* (1400–2200 m)

COMPILED BY H. B. FELL,
T. HOLZINGER, AND M. SHERRADEN

AMERICAN GEOGRAPHICAL SOCIETY—1969